



**Área: 1.551.690km<sup>2</sup>**

### **1. População**

Capitais	Habitantes*
Aracaju – SE	461.534
Fortaleza – CE	2.141.402
João Pessoa – PB	597.934
Maceió – AL	797.759
Natal – RN	712.317
Recife – PE	1.422.905
Salvador – BA	2.443.107
São Luís – MA	870.028
Teresina – PI	715.360
<b>Total</b>	<b>10.162.346</b>

\*IBGE, censo 2004.

### **2. Estudantes**

Estudantes matriculados*			
Ensino	Escolas Públicas	Escolas Privadas	Total
Fundamental**	752.279	195.134	<b>947.413</b>
Médio	569.523	151.264	<b>720.787</b>
<b>Total</b>	<b>1.321.802</b>	<b>346.398</b>	<b>1.668.200</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

# REGIÃO NORDESTE

## SINOPSE

- I – A amostra foi constituída de 15.474 estudantes, sendo a maioria do sexo feminino (52,4%). A faixa etária predominante foi a de 13 a 15 anos, com 32,4% dos entrevistados e 67,6% pertencentes ao ensino fundamental. A defasagem escolar atingiu 54,4% dos estudantes pesquisados. Somente 12,1% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Observou-se maior defasagem escolar de 3 anos ou mais entre os estudantes que já tinham feito *uso na vida* de drogas (30,6%), ao comparar-se com os sem *uso na vida* (21,0%). Entre os alunos com *uso na vida* é maior a porcentagem de estudantes que faltaram à escola, quando comparado aos sem uso. Nas classes sociais A e B houve maior porcentagem de *uso na vida* de drogas (exceto tabaco e álcool) quando se compara aos sem *uso na vida* para essas mesmas classes sociais (Tabela 2).
- III – Quanto aos tipos de uso – *uso na vida* até *uso pesado* – houve predomínio do sexo masculino sobre o feminino para todos os tipos de uso. Embora a partir dos 16 anos se observam as maiores porcentagens de usuários, porém na faixa etária de 10 a 12 anos o número de usuários (*uso na vida*) foi de 5,6% do total de estudantes dessa faixa etária (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, maconha, ansiolíticos, anfetamínicos e anticolinérgicos. O uso de energéticos foi de 9,8%, e o de esteróides anabolizantes, de 1,0%. O total estimado de estudantes com *uso na vida* de drogas, da rede estadual de ensino na região Nordeste, foi de 22,6% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Na Tabela 5 podem-se notar várias diferenças estatisticamente significantes quando se compara o *uso na vida* para as diferentes drogas, entre os sexos. Assim, houve predomínio de *uso na vida* entre os homens para maconha, cocaína, solventes, tabaco, energéticos e esteróides anabolizantes. Nas mulheres o predomínio de *uso na vida* ocorreu para ansiolíticos e álcool.

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 15.474 estudantes das redes municipal e estadual do ensino fundamental e médio da região Nordeste do Brasil.

Características		n	%
Sexo	Masculino	6541	42,3
	Feminino	8106	52,4
	Não informado	827	5,3
	<b>Total</b>	<b>15474</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	3237	20,9
	13-15	5011	32,4
	16-18	3815	24,7
	> 18	1725	11,1
	Não informado	1686	10,9
<b>Total</b>	<b>15474</b>	<b>100,0</b>	
Grau escolar	Fundamental	10460	67,6
	Médio	5014	32,4
	<b>Total</b>	<b>15474</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	5356	34,6
	1 a 2	4850	31,3
	≥ 3	3582	23,1
	Não informado	1686	10,9
	<b>Total</b>	<b>15474</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico	A	231	1,5
	B	1635	10,6
	C	5575	36,0
	D	5233	33,8
	E	1957	12,6
	Não informado	843	5,4
<b>Total</b>	<b>15474</b>	<b>100,0</b>	

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 15.474 estudantes das redes municipal e estadual da região Nordeste<sup>†</sup> do Brasil, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>‡</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	4502	37,6	854	24,5*
	1 a 2	3713	31,0	1137	32,6
	≥ 3	2516	21,0	1066	30,6*
	Não informado	1258	10,5	428	12,3
<b>Total</b>	<b>11989</b>	<b>100,0</b>	<b>3485</b>	<b>100,0</b>	
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	7088	59,1	1531	43,9*
	1 a 3	3299	27,5	1159	33,3*
	4 a 8	655	5,5	344	9,9*
	≥ 9	445	3,7	287	8,2*
	Não informado	502	4,2	164	4,7
<b>Total</b>	<b>11989</b>	<b>100,0</b>	<b>3485</b>	<b>100,0</b>	
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	153	1,3	78	2,2
	B	1184	9,9	451	12,9**
	C	4290	35,8	1285	36,9
	D	4126	34,4	1107	31,8
	E	1560	13,0	397	11,4**
	Não informado	676	5,6	167	4,8
<b>Total</b>	<b>11989</b>	<b>100,0</b>	<b>3485</b>	<b>100,0</b>	

<sup>†</sup> Aracaju-SE, Fortaleza-CE, João Pessoa-PB, Maceió-AL, Natal-RN, Salvador-BA, São Luís-MA, Recife-PE, Teresina-PI.

<sup>‡</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

\*\* Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 15.474 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual da região Nordeste; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	22,8	17,9*	23,7	5,6	18,5	24,9	28,7	23
<i>Uso no ano</i>	20,3	15,6	21,5	4,5	16,4	22,7	25,3	20,2
<i>Uso no mês</i>	15,7	11,7*	18,2	3,7	11,7	16,8	20,6	17,7
<i>Uso freqüente</i>	3,4	2,0*	3,6	0,7	2,3	3,3	4,5	3,1
<i>Uso pesado</i>	2,3	1,3*	2,3	0,5	1,5	2,2	3,1	1,8

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

\* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 15.474 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual da região Nordeste; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Frequente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	5,1	3,9	2,9	0,6	0,4
Cocaína	1,2	1,0	0,8	0,1	0,1
Crack	0,7	0,6	0,5	0,1	0,0
Anfetamínicos	3,6	2,9	1,8	0,5	0,3
Solventes	16,3	15,2	10,6	1,5	0,9
Ansiolíticos	4,7	4,4	2,9	0,5	0,3
Anticolinérgicos	1,5	0,9	0,6	0,1	0,1
Barbitúricos	0,7	0,7	0,5	0,1	0,1
Opiáceos	0,3	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,3	–	–	–	–
Alucinógenos	0,3	–	–	–	–
Orexígenos	1,1	–	–	–	–
Energéticos	9,8	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	1,0	–	–	–	–
Total tipos de uso•	22,6	19,9	15,2	3,0	2,0
Tabaco	23,9	15,0	9,5	3,6	2,4
Álcool	66,0	64,0	44,7	12,5	7,2

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 15.474 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual da região Nordeste; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	7,6	2,9*	7,5	0,3	2,5	7,7	13,2	8,5
Cocaína	1,9	0,6*	2,2	0,7	0,7	1,3	3,3	2,3
Crack	1,0	0,4	1,4	1,5	0,6	0,7	1,8	1,4
Anfetamínicos	3,3	3,9	3,3	0,2	3,3	4,4	5,0	5,1
Solventes	19,4	13,6*	18,1	1,5	16,0	20,9	22,3	15,2
Ansiolíticos	4,2	5,1*	5,5	8,0	4,0	5,8	8,0	7,3
Anticolinérgicos	1,8	1,1	2,7	1,3	1,2	1,5	2,8	1,8
Barbitúricos	0,8	0,6	0,9	1,3	0,7	0,9	1,2	0,8
Opiáceos	0,4	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
Xaropes	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,0	0,3
Alucinógenos	0,4	0,2	0,2	0,1	0,4	0,6	0,5	0,3
Orexígenos	0,6	1,5	1,3	0,3	0,7	1,5	2,2	1,5
Energéticos	13,1	7,1*	10,1	2,8	9	14,5	19,2	10,0
Esteróides/Anabolizantes	2,0	0,1*	2,1	0,4	0,6	1,9	2,5	1,5
Total tipos de uso•	25,2	20,1*	26,3	11,3	22,0	29,4	34,4	26,8
Tabaco	25,8	22,1*	26,1	5,2	21,0	36,0	36,9	34,9
Álcool	65,9	66,4	62,8	39,1	66,5	79,4	83,2	71,3

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).



### 1. População

• População geral	461.534 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>
• População de 10-19 anos	99.099 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>

### 2. Estudantes

Estudantes matriculados em 2004*			
Ensino	Escola Pública	Escola Privada	Total
Fundamental**	33.440	8.380	41.820
Médio	24.975	6.710	31.685
<b>Total</b>	<b>58.415</b>	<b>15.090</b>	<b>73.505</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

### 3. Amostra

	Escolas Públicas*	Escolas Sorteadas	Turmas Sorteadas
Municipais	01	01	16
Estaduais	52	11	27
Federais	27	0	0
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>43</b>

\*INEP-ME, 2003.

<b>Questionários</b>	Aplicados	983
	Em branco	36
	Excluídos	46
	<b>Válidos</b>	<b>901</b>

# Aracaju–SE

## Equipe

supervisão

Maria Cristina Cacho Abuibad

coordenação

Marcos André de Castro Souza

entrevistadores

Adriana Maria Cacho Feitoza

Anatália de Jesus Santos

Edenilson de Jesus Gonçalves Maia

Maria Rosenilde Santos

Sigrid Marney Cacho Maia

## SINOPSE

- I – A amostra constituiu-se de 901 estudantes com maior representação do sexo feminino (52,3%) e maiores porcentagens nas faixas etárias de 13 a 15 anos e de 16 a 18 anos. Ressalte-se que 63,0% da amostra apresentou defasagem escolar e apenas 8,6% foi classificada nos níveis socioeconômicos A ou B (Tabela 1).
- II – Um número significativamente maior de alunos com *uso na vida* tem defasagem escolar de 1 a 2 anos, comparados aos sem *uso na vida* para o mesmo critério. Da mesma forma, aqueles com *uso na vida* faltaram mais à escola nos últimos 30 dias que antecederam a pesquisa que os sem *uso na vida* (exceto tabaco e álcool). Em relação ao nível socioeconômico não houve diferenças estatísticas entre a presença ou não de *uso na vida* (Tabela 2).
- III – Na amostra de Aracaju houve porcentagens idênticas de estudantes em ambos os sexos que fizeram *uso na vida* de drogas, sendo este uso já detectado na faixa etária de 10 a 12 anos. O *uso freqüente* (6 ou mais vezes/mês) e o *uso pesado* de drogas (20 vezes ou mais no último mês) foram, curiosamente, maiores para o sexo feminino (Tabela 3).
- IV – Excetuando-se álcool e tabaco, as drogas mais freqüentemente usadas pela ordem foram: solventes, maconha, anfetamínicos, ansiolíticos e cocaína. Os energizantes apareceram com 5,7% de *uso na vida* e não foram listados, pois é discutível se é ou não droga de abuso. O *uso pesado* de álcool foi feito por 5,6%. Há um total estimado de 16,5% de estudantes, das redes municipal e estadual de ensino de Aracaju, que fizeram *uso na vida* de drogas psicotrópicas – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Entre as mulheres houve predomínio significativo do *uso na vida* de anfetamínicos e ansiolíticos. Entre os homens houve predomínio estatisticamente significativo para *uso na vida* de maconha e energizantes quando comparados às mulheres (Tabela 5).

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 901 estudantes das redes municipal e estadual de Aracaju.

Características		n	%
Sexo	Masculino	376	41,7
	Feminino	471	52,3
	Não informado	54	6,0
	<b>Total</b>	<b>901</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	140	15,5
	13-15	333	37,0
	16-18	288	32,0
	> 18	85	9,4
	Não informado	55	6,1
	<b>Total</b>	<b>901</b>	<b>100,0</b>
Grau escolar	Fundamental	710	78,8
	Médio	191	21,2
	<b>Total</b>	<b>901</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	279	31,0
	1 a 2	270	30,0
	≥ 3	297	33,0
	Não informado	55	6,1
	<b>Total</b>	<b>901</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico	A	8	0,9
	B	69	7,7
	C	259	28,7
	D	318	35,3
	E	135	15,0
	Não informado	112	12,4
<b>Total</b>	<b>901</b>	<b>100,0</b>	

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 901 estudantes das redes municipal e estadual de Aracaju, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>‡</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	250	33,1	29	19,9*
	1 a 2	214	28,3	56	38,4*
	≥ 3	247	32,7	50	34,2
	Não informado	44	5,8	11	7,5
	<b>Total</b>	<b>755</b>	<b>100,0</b>	<b>146</b>	<b>100,0</b>
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	377	49,9	69	47,3
	1 a 3	197	26,1	38	26,0
	4 a 8	72	9,5	12	8,2
	≥ 9	38	5,0	13	8,9*
	Não informado	71	9,4	14	9,6
<b>Total</b>	<b>755</b>	<b>100,0</b>	<b>146</b>	<b>100,0</b>	
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	7	0,9	1	0,7
	B	54	7,2	15	10,3
	C	210	27,8	49	33,6
	D	276	36,6	42	28,8
	E	108	14,3	27	18,5
	Não informado	100	13,2	12	8,2
<b>Total</b>	<b>755</b>	<b>100,0</b>	<b>146</b>	<b>100,0</b>	

<sup>‡</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 901 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Aracaju; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	16,7	16,0	23,4	8,4	13,7	22,4	33,1	32,3
<i>Uso no ano</i>	14,0	11,9	17,1	8,1	10,6	17,8	20,8	23,3
<i>Uso no mês</i>	11,6	9,4	16,2	7,8	7,7	15,1	21,2	22,3
<i>Uso freqüente</i>	1,7	2,5	5,2	0,3	1,1	2,1	3,5	6,3
<i>Uso pesado</i>	0,6	2,5	0,0	0,0	0,8	1,7	3,5	0,0

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 901 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Aracaju; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Frequente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	5,5	3,8	3,9	0,3	0,1
Cocaína	1,3	1,0	0,6	0,1	0,0
Crack	0,6	0,5	0,5	0,1	0,0
Anfetamínicos	4,3	2,8	1,5	0,5	0,4
Solventes	6,4	5,5	3,7	0,4	0,2
Ansiolíticos	3,5	3,0	2,1	0,3	0,2
Anticolinérgicos	1,0	0,6	0,5	0,0	0,0
Barbitúricos	0,7	0,7	0,6	0,4	0,2
Opiáceos	0,1	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,1	–	–	–	–
Alucinógenos	0,1	–	–	–	–
Orexígenos	0,4	–	–	–	–
Energéticos	5,7	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	0,5	–	–	–	–
Total tipos de uso•	16,5	13,0	10,6	2,1	1,5
Tabaco	17,1	12,6	9,6	1,8	1,3
Álcool	46,1	43,2	31,5	9,1	5,6

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 901 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Aracaju; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	8,0	3,2*	8,5	2,9	3,1	7,3	9,5	10,4
Cocaína	1,8	1,1	0,0	0,3	0,2	1,8	4,1	1,0
Crack	0,5	0,7	0,0	0,0	0,3	0,9	2,3	0,0
Anfetamínicos	2,8	5,8*	1,1	4,2	1,8	6,6	7,5	17,7
Solventes	6,1	6,3	17,8	2,6	6,3	8,2	9,6	11,5
Ansiolíticos	2,5	4,3*	6,5	0,0	2,7	4,4	9,3	6,3
Anticolinérgicos	0,9	1,2	0,0	0,0	1,0	1,9	0,0	5,2
Barbitúricos	0,3	1,1	0,0	0,0	0,6	0,8	0,9	0,0
Opiáceos	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Xaropes	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Alucinógenos	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Orexígenos	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	0,0
Energéticos	7,9	3,4*	9,7	0,3	4,5	6,2	8,9	7,7
Esteróides/Anabolizantes	0,6	0,2	5,2	0,3	0,4	0,0	0,9	5,2
Total tipos de uso•	16,7	16,0	23,4	8,4	13,7	22,4	33,1	32,3
Tabaco	19,9	14,7	22,3	3,3	13,7	27,7	30,0	18,8
Álcool	44,2	47,4	50,4	22,1	49,6	47,7	59,1	57,7

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).





### 1. População

• População geral	2.141.402 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>
• População de 10-19 anos	454.927 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>

### 2. Estudantes

Estudantes matriculados em 2004*			
Ensino	Escola Pública	Escola Privada	Total
Fundamental**	162.176	52.051	214.227
Médio	111.133	38.875	150.008
<b>Total</b>	<b>273.309</b>	<b>90.926</b>	<b>364.235</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

### 3. Amostra

	Escolas Públicas*	Escolas Sorteadas	Turmas Sorteadas
Municipais	158	08	29
Estaduais	192	12	48
Federais	02	0	0
<b>Total</b>	<b>352</b>	<b>20</b>	<b>77</b>

\*INEP-ME, 2003.

<b>Questionários</b>	Aplicados	1.901
	Em branco	06
	Excluídos	25
	<b>Válidos</b>	<b>1.870</b>

# Fortaleza–CE

## Equipe

supervisão

Luciane Ponte e Silva

coordenação

Selene Regina Mazza

entrevistadores

Adriana Carla Avelino Mazza

Carolina Eugênia Silva Studart Soares

Lúcia Ponte e Silva

Mariza Araújo Teles Ponte Ensino

## SINOPSE

- I – A amostra foi constituída de 1.870 estudantes, sendo a maioria do sexo feminino. A faixa etária que teve a maior representação foi a de 13 a 15 anos e 66,8% dos estudantes pertenciam ao ensino fundamental. A defasagem escolar atingiu 59,8% dos estudantes pesquisados. Somente 8,4% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Observou-se maior defasagem escolar de 3 anos ou mais entre os alunos que fizeram *uso na vida* de drogas, ao comparar-se com os sem uso. Entre aqueles com *uso na vida* é maior a porcentagem dos que faltaram à escola (56,6%), quando comparada aos sem *uso na vida* – exceto tabaco e álcool (42,6%). Nas classes sociais A e B houve maior porcentagem de estudantes com *uso na vida*, quando se compara aos sem uso para essas mesmas duas classes sociais (Tabela 2).
- III – Quanto às categorias de tipos de uso – *uso na vida* até *uso pesado* – houve predomínio de uso para o sexo masculino. A partir dos 16 anos observam-se as maiores porcentagens de usuários, porém na faixa etária de 10 a 12 anos já é expressivo o número de usuários (*uso na vida*), com 11,0% do total de estudantes (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, maconha, anfetamínicos, ansiolíticos e cocaína. Por outro lado, os energéticos apareceram com 9,6% de *uso na vida*. O total estimado de estudantes com *uso na vida* de drogas, das redes municipal e estadual de ensino em Fortaleza, foi de 23,9% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Na Tabela 5 podem-se notar várias diferenças estatisticamente significantes, quando se compara o *uso na vida* para as diferentes drogas, entre os sexos. Assim, houve predomínio de *uso na vida* entre os homens para maconha, cocaína, crack, solventes, energéticos, esteróides anabolizantes e álcool. Nas mulheres o predomínio de *uso na vida* ocorreu para anfetamínicos e ansiolíticos. Na faixa etária de 10 a 12 anos apareceram 12,1% de estudantes com *uso na vida* de drogas.

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 1.870 estudantes das redes municipal e estadual de Fortaleza.

Características		n	%
Sexo	Masculino	864	46,2
	Feminino	941	50,3
	Não informado	65	3,5
	<b>Total</b>	<b>1870</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	365	19,5
	13-15	633	33,9
	16-18	463	24,8
	> 18	226	12,1
	Não informado	183	9,8
<b>Total</b>	<b>1870</b>	<b>100,0</b>	
Grau escolar	Fundamental	1250	66,8
	Médio	620	33,2
	<b>Total</b>	<b>1870</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	569	30,4
	1 a 2	681	36,4
	≥ 3	437	23,4
	Não informado	183	9,8
<b>Total</b>	<b>1870</b>	<b>100,0</b>	
Nível socio-econômico	A	18	1,0
	B	138	7,4
	C	594	31,8
	D	723	38,7
	E	289	15,5
	Não informado	108	5,8
<b>Total</b>	<b>1870</b>	<b>100,0</b>	

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.870 estudantes das redes municipal e estadual de Fortaleza, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>‡</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	465	32,7	104	23,3*
	1 a 2	521	36,6	160	35,8
	≥ 3	307	21,6	130	29,1*
	Não informado	130	9,1	53	11,9
<b>Total</b>	<b>1423</b>	<b>100,0</b>	<b>447</b>	<b>100,0</b>	
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	772	54,3	172	38,5*
	1 a 3	448	31,5	157	35,1
	4 a 8	98	6,9	54	12,1*
	≥ 9	60	4,2	42	9,4*
	Não informado	45	3,2	22	4,9
<b>Total</b>	<b>1423</b>	<b>100,0</b>	<b>447</b>	<b>100,0</b>	
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	9	0,6	9	2,0
	B	97	6,8	41	9,2**
	C	451	31,7	143	32,0
	D	558	39,2	165	36,9
	E	224	15,7	65	14,5
	Não informado	84	5,9	24	5,4
<b>Total</b>	<b>1423</b>	<b>100,0</b>	<b>447</b>	<b>100,0</b>	

<sup>‡</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

\*\* Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.870 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Fortaleza; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	25,7	21,0*	41,1	11,0	23,0	28,9	32,6	32,4
<i>Uso no ano</i>	22,4	16,8*	41,7	7,5	20,7	25,5	25,8	27,5
<i>Uso no mês</i>	17,5	12,5*	34,2	5,8	15,1	18,9	22,0	23,0
<i>Uso freqüente</i>	3,8	1,7*	8,1	0,2	2,9	3,9	4,0	4,6
<i>Uso pesado</i>	2,4	1,0*	4,8	0,2	1,6	2,3	1,9	3,9

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

\* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 1.870 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Fortaleza; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Freqüente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	7,0	5,0	3,1	0,8	0,4
Cocaína	2,3	1,9	1,4	0,3	0,1
Crack	1,1	0,9	0,4	0,1	0,0
Anfetamínicos	6,4	5,0	2,9	0,6	0,5
Solventes	14,0	13,0	9,2	0,9	0,6
Ansiolíticos	6,3	5,9	3,6	0,6	0,4
Anticolinérgicos	1,6	0,9	0,6	0,1	0,1
Barbitúricos	0,8	0,7	0,5	0,1	0,1
Opiáceos	0,4	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,4	–	–	–	–
Alucinógenos	0,2	–	–	–	–
Orexígenos	1,8	–	–	–	–
Energéticos	9,6	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	1,4	–	–	–	–
Total tipos de uso•	23,9	20,2	15,6	2,9	1,8
Tabaco	30,0	20,0	11,8	4,6	2,7
Álcool	71,4	68,5	46,3	11,9	6,9

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.870 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Fortaleza; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	10,3	3,3*	17,3	0,7	3,7	11,6	15,1	11,1
Cocaína	3,7	0,5*	9,4	0,7	1,4	2,2	7,1	3,4
Crack	2,0	0,3*	1,9	0,4	1,0	1,0	3,9	0,5
Anfetamínicos	5,7	6,9*	7,2	1,9	5,9	8,8	7,0	9,5
Solventes	16,8	11,2*	19,3	6,7	15,1	18,0	18,6	13,3
Ansiolíticos	5,4	6,6	14,3	2,0	5,3	8,4	8,9	11,1
Anticolinérgicos	1,8	1,1	6,9	1,6	0,3	1,5	5,5	3,6
Barbitúricos	0,8	0,7	1,4	0,9	0,4	1,2	1,1	0,6
Opiáceos	0,6	0,2	0,0	0,1	0,3	0,4	1,1	0,2
Xaropes	0,3	0,3	2,9	0,4	0,7	0,0	0,0	0,6
Alucinógenos	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,4	0,6	0,0
Orexígenos	0,8	2,8	1,4	1,6	1,3	1,9	4,8	1,3
Energéticos	12,9	6,2*	16,4	4,1	8,3	14,5	14,8	16,9
Esteróides/Anabolizantes	2,6	0,3*	1,9	0,7	0,3	1,9	2,7	1,2
Total tipos de uso•	25,7	21,0	41,1	12,1	22,9	30,8	34,5	35,0
Tabaco	31,1	28,3	42,1	10,7	28,1	39,3	39,0	48,4
Álcool	71,3	70,8*	82,3	52,0	70,6	84,7	87,1	83,6

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).



### 1. População

• População geral	597.934 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>
• População de 10-19 anos	124.559 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>

### 2. Estudantes

Estudantes matriculados em 2004*			
Ensino	Escola Pública	Escola Privada	Total
Fundamental**	53.313	12.551	65.864
Médio	26.088	10.897	36.985
<b>Total</b>	<b>79.401</b>	<b>23.448</b>	<b>102.849</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

### 3. Amostra

	Escolas Públicas*	Escolas Sorteadas	Turmas Sorteadas
Municipais	64	05	22
Estaduais	68	11	48
Federais	01	0	0
<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>16</b>	<b>70</b>

\*INEP-ME, 2003.

<b>Questionários</b>	Aplicados	2.033
	Em branco	17
	Excluídos	09
	<b>Válidos</b>	<b>2.007</b>

# João Pessoa–PB

## Equipe

supervisão

Ednilza Pereira de Farias Dias

coordenação

Claudia Larissa de Sousa

entrevistadores

Alexandre de Sousa Carlos

Charlene de Oliveira Pereira

Ricardo Henrique de Sousa Araújo

Tarciana Vieira da Costa

Tatiana Filizola Dantas Carneiro

## SINOPSE

- I – A amostra constou de 2.007 estudantes, sendo a maioria do sexo feminino (55,4%). A maior parte da amostra encontrava-se na faixa etária de 13 a 15 anos (31,0%), sendo que 67,3% dos estudantes cursavam o ensino fundamental. Em João Pessoa, 49,9% dos estudantes apresentaram defasagem escolar e 21,1% pertenciam às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Foi maior a porcentagem de alunos com *uso na vida* de drogas (exceto tabaco e álcool) que apresentaram defasagem escolar em comparação aos sem *uso na vida*. Da mesma forma, foi maior a porcentagem de alunos que já fizeram *uso na vida* que faltaram à escola nos últimos 30 dias, quando comparado aos sem esse tipo de uso. Ao analisar em conjunto as classes sociais A e B, nota-se que houve maior número de estudantes com *uso na vida* que os sem uso, pertencentes a essas duas classes sociais (Tabela 2).
- III – Houve diferenças estatisticamente significantes em todos os tipos de uso (*uso na vida, ano, mês, freqüente e pesado*) em que predominou o uso no sexo masculino. As maiores porcentagens de *uso na vida* apareceram a partir dos 18 anos de idade, porém na faixa etária de 10 a 12 anos 11,5% dos estudantes já fizeram *uso na vida* de drogas (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas (*uso na vida*) pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, anfetamínicos, maconha, ansiolíticos, crack e cocaína. Por sua vez, o uso de energéticos foi de 11,8%. O total estimado de estudantes com *uso na vida*, nas redes municipal e estadual de João Pessoa, foi de 22,9% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Na Tabela 5 nota-se o predomínio do sexo masculino sobre o feminino, com diferenças estatisticamente significantes para *uso na vida* de maconha, solventes, crack, energéticos e esteróides anabolizantes. O *uso na vida* de solventes já atinge os 9,5% na faixa etária de 10 a 12 anos.

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 2.007 estudantes das redes municipal e estadual de João Pessoa.

Características		n	%
Sexo	Masculino	841	41,9
	Feminino	1112	55,4
	Não informado	54	2,7
	<b>Total</b>	<b>2007</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	425	21,2
	13-15	623	31,0
	16-18	465	23,2
	> 18	285	14,2
	Não informado	209	10,4
<b>Total</b>	<b>2007</b>	<b>100,0</b>	
Grau escolar	Fundamental	1350	67,3
	Médio	657	32,7
	<b>Total</b>	<b>2007</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	796	39,7
	1 a 2	508	25,3
	≥ 3	494	24,6
	Não informado	209	10,4
<b>Total</b>	<b>2007</b>	<b>100,0</b>	
Nível socio-econômico	A	50	2,5
	B	373	18,6
	C	821	40,9
	D	562	28,0
	E	141	7,0
	Não informado	60	3,0
<b>Total</b>	<b>2007</b>	<b>100,0</b>	

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 2.007 estudantes das redes municipal e estadual de João Pessoa, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>‡</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	644	44,0	152	28,0*
	1 a 2	341	23,3	167	30,8*
	≥ 3	333	22,7	161	29,7
	Não informado	146	10,0	63	11,6
<b>Total</b>	<b>1464</b>	<b>100,0</b>	<b>543</b>	<b>100,0</b>	
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	874	59,7	241	44,4*
	1 a 3	421	28,8	197	36,3*
	4 a 8	79	5,4	55	10,1*
	≥ 9	48	3,3	30	5,5*
	Não informado	42	2,9	20	3,7
<b>Total</b>	<b>1464</b>	<b>100,0</b>	<b>543</b>	<b>100,0</b>	
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	32	2,2	18	3,3
	B	259	17,7	114	21,0**
	C	589	40,2	232	42,7
	D	430	29,4	132	24,3
	E	111	7,6	30	5,5**
	Não informado	43	2,9	17	3,1
<b>Total</b>	<b>1464</b>	<b>100,0</b>	<b>543</b>	<b>100,0</b>	

<sup>‡</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

\*\* Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 2.007 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de João Pessoa; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	30,7	24,0*	27,5	11,5	27,2	34,9	30,2	28,2
<i>Uso no ano</i>	28,3	22,1*	18,8	8,9	26,1	33,8	27,2	24,4
<i>Uso no mês</i>	21,8	15,9*	21,3	7,0	17,9	25,0	22,4	23,2
<i>Uso freqüente</i>	5,4	3,4*	8,8	2,1	4,1	5,6	5,4	5,5
<i>Uso pesado</i>	4,2	2,0*	5,0	1,8	2,6	4,0	4,3	2,7

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

\* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 2.007 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de João Pessoa; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Frequente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	4,0	3,3	2,3	0,5	0,4
Cocaína	1,2	1,2	1,1	0,5	0,4
Crack	2,5	0,7	0,6	0,2	0,1
Anfetamínicos	6,6	5,6	4,0	0,9	0,4
Solventes	18,9	18,3	12,2	2,1	1,5
Ansiolíticos	5,9	5,2	3,3	0,8	0,4
Anticolinérgicos	1,5	1,4	1,1	0,2	0,2
Barbitúricos	1,1	0,9	0,5	0,0	0,0
Opiáceos	0,7	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,2	–	–	–	–
Alucinógenos	0,7	–	–	–	–
Orexígenos	1,3	–	–	–	–
Energéticos	11,8	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	1,6	–	–	–	–
Total tipos de uso•	22,9	21,0	15,6	3,4	2,3
Tabaco	23,0	13,2	8,1	3,7	2,8
Álcool	64,3	63,4	41,9	11,4	6,9

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 2.007 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de João Pessoa; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	6,4	3,6*	6,0	0,0	2,8	6,2	11,1	9,9
Cocaína	1,1	0,5	0,0	0,7	0,8	0,3	1,0	1,5
Crack	1,4	0,7*	0,0	0,6	1,3	0,9	0,7	2,1
Anfetamínicos	4,5	4,4	1,9	2,0	3,6	4,5	5,2	6,9
Solventes	24,5	17,5*	15,2	9,5	21,9	27,0	22,3	16,5
Ansiolíticos	6,6	6,7	9,8	2,0	6,8	8,9	5,5	11,0
Anticolinérgicos	2,2	1,5	4,3	0,7	1,2	2,5	3,0	3,6
Barbitúricos	1,3	0,8	0,0	0,9	0,9	1,2	1,0	0,9
Opiáceos	0,7	0,7	0,0	1,0	1,3	0,2	0,0	0,6
Xaropes	0,2	0,5	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	1,1
Alucinógenos	0,6	0,3	0,0	0,4	0,5	0,7	0,4	0,0
Orexígenos	1,2	1,8	1,9	0,0	0,5	2,7	1,5	3,6
Energéticos	17,5	10,7*	11,5	3,4	13,7	20,6	18,7	11,3
Esteróides/Anabolizantes	3,7	0,0*	1,9	0,2	1,7	3,9	1,7	0,6
Total tipos de uso•	30,7	24,0	27,5	11,5	27,2	34,9	30,2	28,2
Tabaco	29,5	27,0	18,6	5,1	25,1	37,5	37,5	43,2
Álcool	76,2	74,3	57,5	41,6	75,3	86,0	84,1	75,4

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).





### 1. População

• População geral	797.759 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>
• População de 10-19 anos	166.753 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>

### 2. Estudantes

Estudantes matriculados em 2004*			
Ensino	Escola Pública	Escola Privada	Total
Fundamental**	68.486	13.501	<b>81.987</b>
Médio	35.110	10.481	<b>45.591</b>
<b>Total</b>	<b>103.596</b>	<b>23.982</b>	<b>127.578</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

### 3. Amostra

	Escolas Públicas*	Escolas Sorteadas	Turmas Sorteadas
Municipais	30	05	20
Estaduais	69	11	50
Federais	01	0	0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>70</b>

\*INEP-ME, 2003.

Questionários	Aplicados	1.919
	Em branco	0
	Excluídos	02
	<b>Válidos</b>	<b>1.917</b>

# Maceió-AL

## Equipe

supervisão e coordenação

**Maria de Fátima Vieira**

entrevistadores

**Arnoldo José de Oliveira Melo**

**Emilia de Fátima Silva de Matos**

**Luciano Vieira Brandão**

**Maria José Vieira**

## SINOPSE

- I – A amostra obtida na cidade de Maceió constituiu-se de 1.917 estudantes, sendo 54,4% do sexo feminino. A maior parte da amostra estava na faixa etária de 13 a 15 anos (32,1%) e 76,2% dos estudantes cursavam o ensino fundamental no momento da pesquisa. Mais de 70% dos alunos apresentaram defasagem escolar e apenas 6,9% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Os estudantes sem *uso na vida* de drogas (exceto tabaco e álcool) apresentaram menos defasagem escolar (20,9%) que os positivos para essa característica (83,8%). Quanto às faltas, os sem *uso na vida* compareceram mais às aulas que os que fizeram *uso na vida de drogas*. Não houve diferenças estatísticas quando se compararam a presença ou não do *uso na vida* de drogas e as classes sociais a que pertenciam (Tabela 2).
- III – Houve diferenças estatísticas com relação ao uso de drogas entre os sexos masculino e feminino para todos os tipos de uso (*uso na vida, no ano, mês, freqüente e pesado*), com predomínio para o masculino. A faixa etária com maior número de usuários foi a de acima de 18 anos, sendo 5,9% para a faixa etária de 10 a 12 anos (Tabela 3).
- IV – Exceto o álcool e o tabaco, as drogas mais utilizadas (*uso na vida*) pela ordem foram: solventes, maconha, ansiolíticos e anfetamínicos, enquanto o uso de energéticos foi de 9,8%. O total estimado de estudantes com *uso na vida*, das redes municipal e estadual de ensino de Maceió, foi de 20,8% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Os solventes, a maconha, os energéticos e os esteróides anabolizantes tiveram mais *uso na vida* pelos alunos do sexo masculino quando comparados ao feminino. O contrário foi observado para os anfetamínicos e os ansiolíticos. As idades em que aparecem as maiores porcentagens de usuários são acima dos 16 anos (Tabela 5).

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 1.917 estudantes das redes municipal e estadual de Maceió.

Características		n	%
Sexo	Masculino	842	43,9
	Feminino	1043	54,4
	Não informado	32	1,7
	<b>Total</b>	<b>1917</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	233	12,2
	13-15	616	32,1
	16-18	543	28,3
	> 18	345	18,0
	Não informado	180	9,4
<b>Total</b>	<b>1917</b>	<b>100,0</b>	
Grau escolar	Fundamental	1460	76,2
	Médio	457	23,8
	<b>Total</b>	<b>1917</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	349	18,2
	1 a 2	548	28,6
	≥ 3	840	43,8
	Não informado	180	9,4
<b>Total</b>	<b>1917</b>	<b>100,0</b>	
Nível socio-econômico	A	11	0,6
	B	120	6,3
	C	618	32,2
	D	702	36,6
	E	344	17,9
	Não informado	122	6,4
<b>Total</b>	<b>1917</b>	<b>100,0</b>	

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.917 estudantes das redes municipal e estadual de Maceió, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>‡</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	318	20,9	31	7,8*
	1 a 2	448	29,4	100	25,3
	≥ 3	609	40,0	231	58,5*
	Não informado	147	9,7	33	8,4
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1522</b>	<b>100,0</b>	<b>395</b>	<b>100,0</b>
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	896	58,9	166	42,0*
	1 a 3	450	29,6	114	28,9
	4 a 8	86	5,7	53	13,4*
	≥ 9	41	2,7	40	10,1*
	Não informado	49	3,2	22	5,6
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1522</b>	<b>100,0</b>	<b>395</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	8	0,5	3	0,8
	B	98	6,4	22	5,6
	C	475	31,2	143	36,2
	D	558	36,7	144	36,5
	E	288	18,9	56	14,2
	Não informado	95	6,2	27	6,8
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1522</b>	<b>100,0</b>	<b>395</b>	<b>100,0</b>

<sup>‡</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.917 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Maceió; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	24,7	18,0*	9,5	5,9	17,4	24,6	31,5	18,6
<i>Uso no ano</i>	23,2	15,3*	9,5	4,2	15,7	23,1	28,9	14,0
<i>Uso no mês</i>	19,2	11,4*	6,6	3,8	12,2	18,1	22,7	12,3
<i>Uso freqüente</i>	3,8	2,0*	0,0	0,3	1,7	3,6	5,2	3,0
<i>Uso pesado</i>	2,6	1,5*	0,0	0,3	1,6	2,5	3,1	2,2

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

\* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 1.917 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Maceió; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Frequente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	5,5	4,6	3,6	0,7	0,5
Cocaína	0,6	0,6	0,5	0,2	0,1
Crack	0,6	0,6	0,3	0,2	0,1
Anfetamínicos	1,8	1,6	1,0	0,3	0,2
Solventes	16,0	15,1	11,6	1,6	1,1
Ansiolíticos	4,4	4,1	2,8	0,6	0,4
Anticolinérgicos	0,9	0,7	0,5	0,0	0,0
Barbitúricos	0,6	0,6	0,5	0,1	0,0
Opiáceos	0,2	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,2	–	–	–	–
Alucinógenos	0,3	–	–	–	–
Orexígenos	1,2	–	–	–	–
Energéticos	9,8	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	0,3	–	–	–	–
Total tipos de uso•	20,8	18,7	14,8	2,8	2,0
Tabaco	24,3	15,8	11,0	4,5	3,6
Álcool	67,4	64,9	47,3	13,6	8,7

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.917 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Maceió; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	9,3	2,4*	3,0	0,0	2,2	6,8	11,6	6,7
Cocaína	0,6	0,6	0,0	0,0	0,3	1,0	1,2	0,0
Crack	0,8	0,4	0,0	0,0	0,3	1,1	0,9	0,0
Anfetamínicos	1,2	2,3*	0,0	0,6	1,4	1,8	2,6	2,5
Solventes	21,7	11,7*	6,6	3,5	13,8	20,5	24,2	8,1
Ansiolíticos	3,7	5,1*	0,0	0,0	3,7	4,4	7,0	8,5
Anticolinérgicos	1,1	0,8	0,0	0,3	0,7	1,5	0,8	0,8
Barbitúricos	0,8	0,4	0,0	0,3	0,5	0,5	0,8	0,8
Opiáceos	0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,2	0,3	0,0
Xaropes	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0
Alucinógenos	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	0,0
Orexígenos	0,2	1,8*	3,0	1,8	0,6	1,8	1,1	1,8
Energéticos	11,9	8,1*	9,5	2,9	8,7	9,8	15,4	9,0
Esteróides/Anabolizantes	0,7	0,0	0,0	0,3	0,1	0,5	0,2	0,0
Total tipos de uso•	24,7	18,0*	9,5	5,9	17,4	24,6	31,5	18,6
Tabaco	27,0	22,5*	14,9	4,5	17,9	32,4	30,3	32,8
Álcool	67,6	67,3	61,7	29,8	60,8	76,4	81,4	72,8

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).



### 1. População

• População geral	712.317 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>
• População de 10-19 anos	151.014 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>

### 2. Estudantes

Estudantes matriculados em 2004*			
Ensino	Escola Pública	Escola Privada	Total
Fundamental**	44.545	13.963	58.508
Médio	43.597	11.691	55.288
<b>Total</b>	<b>88.142</b>	<b>25.654</b>	<b>113.796</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

### 3. Amostra

	Escolas Públicas*	Escolas Sorteadas	Turmas Sorteadas
Municipais	28	03	20
Estaduais	88	12	44
Federais	01	01	04
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>16</b>	<b>68</b>

\*INEP-ME, 2003.

Questionários	Aplicados	1.668
	Em branco	0
	Excluídos	05
	<b>Válidos</b>	<b>1.663</b>

# Natal–RN

## Equipe

supervisão

Maria Dalva Araújo

coordenação

Ana Paula Queiroz da Silva

entrevistadores

Eliane Delgado Moreira

Maria Conceição Oliveira Américo

Rose Silva de Oliveira

Santana Maria de Freitas

Verônica Maria da Costa Dantas

## SINOPSE

- I – A amostra constou de 1.663 estudantes, sendo 50,6% do sexo feminino. Parte predominante da amostra concentra-se na faixa etária de 13 a 15 anos (32,9%), sendo que 65,3% dos estudantes se encontravam no ensino fundamental. Em Natal, 42,9% dos estudantes apresentaram defasagem escolar, sendo que somente 16,7% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Houve maior porcentagem de estudantes com *uso na vida* de drogas (exceto tabaco e álcool) com defasagem escolar quando comparados aos sem uso. Entre os sem *uso na vida* de drogas é menor o número de faltas à escola (62,8%) que entre os que já fizeram *uso na vida* (45,7%). Houve mais alunos com *uso na vida* de drogas pertencentes às classes sociais A ou B que sem *uso na vida* para essas duas classes sociais analisadas em conjunto (Tabela 2).
- III – Em todos os tipos de uso (*uso na vida, no ano, no mês e freqüente*) houve predomínio estatisticamente significativo do sexo masculino sobre o feminino. Nas faixas etárias de 16 a 18 anos e a partir de 18 anos apareceram as maiores porcentagens de *uso na vida*, já entre 10 a 12 anos observou-se número significativo de usuários (9,6%) (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, maconha, anfetamínicos, ansiolíticos e cocaína. O *uso na vida* de energéticos foi de 5,7%. A estimativa total de estudantes com *uso na vida*, nas redes municipal e estadual de ensino em Natal, foi de 16,5% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Houve predomínio de *uso na vida* para o sexo masculino sobre o feminino com diferenças estatisticamente significantes para maconha, energéticos e tabaco. O contrário acontece para os anfetamínicos, ansiolíticos, barbitúricos e álcool, os quais são mais usados pelas mulheres. Na faixa etária de 10 a 12 anos, o uso de anfetamínicos foi de 4,2% (Tabela 5).

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 1.663 estudantes das redes municipal e estadual de Natal.

Características		n	%
Sexo	Masculino	652	39,2
	Feminino	841	50,6
	Não informado	170	10,2
	<b>Total</b>	<b>1663</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	414	24,9
	13-15	547	32,9
	16-18	333	20,0
	> 18	128	7,7
	Não informado	241	14,5
<b>Total</b>	<b>1663</b>	<b>100,0</b>	
Grau escolar	Fundamental	1086	65,3
	Médio	577	34,7
	<b>Total</b>	<b>1663</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	709	42,6
	1 a 2	507	30,5
	≥ 3	206	12,4
	Não informado	241	14,5
<b>Total</b>	<b>1663</b>	<b>100,0</b>	
Nível socio-econômico	A	44	2,6
	B	234	14,1
	C	673	40,5
	D	488	29,3
	E	157	9,4
	Não informado	67	4,0
<b>Total</b>	<b>1663</b>	<b>100,0</b>	

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.663 estudantes das redes municipal e estadual de Natal, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>‡</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	618	46,7	91	26,8*
	1 a 2	393	29,7	114	33,6
	≥ 3	132	10,0	74	21,8*
	Não informado	181	13,7	60	17,7
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1324</b>	<b>100,0</b>	<b>339</b>	<b>100,0</b>
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	832	62,8	155	45,7*
	1 a 3	355	26,8	113	33,3*
	4 a 8	64	4,8	33	9,7*
	≥ 9	27	2,0	21	6,2*
	Não informado	46	3,5	17	5,0
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1324</b>	<b>100,0</b>	<b>339</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	24	1,8	20	5,9
	B	175	13,2	59	17,4**
	C	554	41,8	119	35,1
	D	383	28,9	105	31,0
	E	129	9,7	28	8,3
	Não informado	59	4,5	8	2,4
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1324</b>	<b>100,0</b>	<b>339</b>	<b>100,0</b>

<sup>‡</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

\*\* Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.663 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Natal; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	25,0	16,8*	28,6	9,6	17,1	35,9	28,6	25,5
<i>Uso no ano</i>	21,2	15,8*	24,7	8,5	14,0	33,6	28,1	24,0
<i>Uso no mês</i>	15,5	11,1*	19,9	6,0	10,2	25,0	23,6	20,2
<i>Uso freqüente</i>	2,8	1,4*	6,2	0,2	2,1	5,8	3,1	4,5
<i>Uso pesado</i>	1,6	0,9*	6,2	0,1	1,0	4,8	2,1	4,5

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

\* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 1.663 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Natal; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Freqüente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	4,7	3,0	2,1	0,3	0,2
Cocaína	1,8	1,4	1,0	0,1	0,1
Crack	0,5	0,4	0,3	0,0	0,0
Anfetamínicos	3,5	2,7	1,6	0,5	0,4
Solventes	15,6	12,7	8,5	1,3	0,9
Ansiolíticos	3,8	3,2	2,2	0,4	0,3
Anticolinérgicos	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0
Barbitúricos	0,6	0,5	0,2	0,1	0,1
Opiáceos	0,2	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,1	–	–	–	–
Alucinógenos	0,5	–	–	–	–
Orexígenos	0,9	–	–	–	–
Energéticos	7,5	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	1,7	–	–	–	–
Total tipos de uso•	20,4	16,1	11,5	2,2	1,5
Tabaco	18,3	9,6	5,2	2,3	1,7
Álcool	63,6	53,5	34,5	9,4	5,4

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.663 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Natal; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	6,6	3,1	5,3	0,0	2,0	9,3	13,3	7,9
Cocaína	2,5	1,1	2,9	0,5	0,9	2,1	6,3	3,3
Crack	0,6	0,1	2,4	0,0	0,2	0,3	1,6	2,1
Anfetamínicos	3,1	3,9	3,5	1,2	2,7	5,4	9,4	3,7
Solventes	18,6	12,6	18,8	5,8	12,4	26,1	27,3	18,7
Ansiolíticos	3,8	3,7	4,7	1,2	2,2	6,6	7,0	6,6
Anticolinérgicos	0,3	0,6	2,9	0,5	1,3	0,0	0,0	1,2
Barbitúricos	0,8	0,5	0,6	0,0	1,1	0,6	0,0	0,8
Opiáceos	0,5	0,1	0,0	0,2	0,4	0,3	0,0	0,0
Xaropes	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0
Alucinógenos	0,9	0,1	0,6	0,0	0,2	0,9	1,6	0,8
Orexígenos	0,6	1,2	0,6	0,0	0,5	1,8	2,3	1,2
Energéticos	11,8	4,6	4,7	2,2	5,9	14,7	15,6	5,8
Esteróides/Anabolizantes	3,1	0,6	2,4	0,2	0,9	4,8	1,6	2,1
Total tipos de uso•	24,1	16,6	24,7	8,9	15,7	33,3	35,2	24,9
Tabaco	19,5	16,9	21,2	2,7	13,9	32,4	35,9	26,6
Álcool	65,3	62,7	61,2	41,1	62,0	83,2	88,3	65,6

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).





### 1. População

• População geral	1.422.905 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>
• População de 10-19 anos	278.308 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>

### 2. Estudantes

Estudantes matriculados em 2004*			
Ensino	Escola Pública	Escola Privada	Total
Fundamental**	110.837	34.352	145.189
Médio	72.092	26.995	99.087
<b>Total</b>	<b>182.929</b>	<b>61.347</b>	<b>244.276</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

### 3. Amostra

	Escolas Públicas*	Escolas Sorteadas	Turmas Sorteadas
Municipais	35	02	08
Estaduais	150	14	54
Federais	03	0	0
<b>Total</b>	<b>188</b>	<b>16</b>	<b>62</b>

\*INEP-ME, 2003.

Questionários	Aplicados	1.713
	Em branco	10
	Excluídos	11
	<b>Válidos</b>	<b>1.692</b>

# Recife-PE

## Equipe

supervisão

Evaldo Melo de Oliveira

coordenação

Diane Neves Varisco

entrevistadores

Cristiane Barros Cavalcanti

Egéria de Fátima Barros Amaral

Lara Liane Varisco Mendes Bezerra

## SINOPSE

- I – A amostra constou de 1.692 estudantes, sendo a maior porcentagem do sexo feminino (49,6%). Parte predominante da amostra concentra-se na faixa etária de 10 a 18 anos, com 15,0% acima dessa faixa, sendo que 65,3% dos estudantes, se encontravam no ensino fundamental. Em Recife, 56,6% dos estudantes apresentaram defasagem escolar, sendo que somente 10,0% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Na comparação entre a presença ou não de *uso na vida* de drogas (exceto tabaco e álcool) houve maior porcentagem de estudantes que já fizeram *uso na vida* com defasagem escolar quando comparados aos sem uso. Entre os sem *uso na vida* é menor o número de faltas à escola que entre os com *uso na vida* de drogas. Não houve diferenças na análise entre os com ou sem *uso na vida* e as classes sociais (Tabela 2).
- III – Em todas as categorias de tipos de uso (*uso na vida, no ano, no mês, frequente e pesado*) houve predomínio estatisticamente significativo do sexo masculino. Nas faixas etárias a partir de 16 a 18 anos e a partir de 18 anos apareceram as maiores porcentagens de *uso na vida*, já entre 10 a 12 anos observou-se número significativo de usuários (8,4%) (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, ansiolíticos, maconha, anfetamínicos e anticolinérgicos. O *uso na vida* de energéticos foi de 12,2%. A estimativa total de estudantes com *uso na vida*, nas redes municipal e estadual de ensino em Recife, foi de 24,9% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Houve predomínio de *uso na vida* para o sexo masculino sobre o feminino, com diferenças estatisticamente significantes para maconha, cocaína, solventes, anticolinérgicos, energéticos e esteróides anabolizantes. O contrário acontece para ansiolíticos e anfetamínicos, os quais foram mais usados pelas mulheres. Na faixa etária de 10 a 12 anos, o uso de solventes aparece com 6,8% do total de estudantes dessa faixa etária (Tabela 5).

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 1.692 estudantes das redes municipal e estadual de Recife.

Características		n	%
Sexo	Masculino	729	43,1
	Feminino	839	49,6
	Não informado	124	7,3
<b>Total</b>		<b>1692</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	396	23,4
	13-15	400	23,6
	16-18	378	22,3
	> 18	254	15,0
	Não informado	264	15,6
<b>Total</b>		<b>1692</b>	<b>100,0</b>
Grau escolar	Fundamental	1105	65,3
	Médio	587	34,7
<b>Total</b>		<b>1692</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	471	27,8
	1 a 2	480	28,4
	≥ 3	477	28,2
	Não informado	264	15,6
<b>Total</b>		<b>1692</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico	A	22	1,3
	B	148	8,7
	C	571	33,7
	D	591	34,9
	E	239	14,1
	Não informado	121	7,2
<b>Total</b>		<b>1692</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.692 estudantes das redes municipal e estadual de Recife, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>‡</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	407	32,0	64	15,2
	1 a 2	371	29,2	109	26,0
	≥ 3	306	24,1	171	40,7
	Não informado	188	14,8	76	18,1
<b>Total</b>		<b>1272</b>	<b>100,0</b>	<b>420</b>	<b>100,0</b>
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	717	56,4	160	38,1
	1 a 3	357	28,1	149	35,5
	4 a 8	81	6,4	50	11,9
	≥ 9	51	4,0	38	9,0
	Não informado	66	5,2	23	5,5
<b>Total</b>		<b>1272</b>	<b>100,0</b>	<b>420</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	15	1,2	7	1,7
	B	106	8,3	42	10,0
	C	440	34,6	131	31,2
	D	444	34,9	147	35,0
	E	176	13,8	63	15,0
	Não informado	91	7,2	30	7,1
<b>Total</b>		<b>1272</b>	<b>100,0</b>	<b>420</b>	<b>100,0</b>

<sup>‡</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.692 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Recife; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	27,4	22,2*	31,4	8,4	22,5	30,6	36,5	28,9
<i>Uso no ano</i>	25,6	21,3*	32,0	7,1	22,2	30,1	33,4	27,4
<i>Uso no mês</i>	18,5	16,0*	29,5	5,6	15,7	19,7	26,5	25,3
<i>Uso freqüente</i>	5,0	3,4*	5,0	2,1	3,6	5,3	6,7	2,5
<i>Uso pesado</i>	3,7	2,2*	3,5	1,6	2,5	3,7	4,9	1,2

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

\* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 1.692 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Recife; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Frequente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	6,6	5,1	3,5	1,0	0,8
Cocaína	0,7	0,7	0,5	0,0	0,0
Crack	0,7	0,6	0,4	0,1	0,1
Anfetamínicos	4,2	3,3	1,7	0,4	0,2
Solventes	19,0	17,9	11,5	1,9	1,1
Ansiolíticos	6,8	6,6	4,5	0,5	0,2
Anticolinérgicos	2,3	1,9	1,4	0,4	0,2
Barbitúricos	1,1	0,9	0,8	0,4	0,2
Opiáceos	0,2	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,3	–	–	–	–
Alucinógenos	0,6	–	–	–	–
Orexígenos	1,0	–	–	–	–
Energéticos	12,2	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	1,1	–	–	–	–
Total tipos de uso•	24,9	23,7	17,9	4,2	2,9
Tabaco	26,8	18,2	12,9	5,5	3,3
Álcool	64,5	62,0	46,4	12,9	7,4

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.692 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Recife; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	9,6	3,8*	8,9	0,2	2,9	9,0	15,5	7,9
Cocaína	1,5	0,0*	1,5	0,0	0,3	1,0	1,7	1,4
Crack	1,1	0,2	2,0	0,0	0,5	1,0	0,8	1,5
Anfetamínicos	3,5	4,7*	5,9	1,6	3,1	5,3	4,9	6,7
Solventes	22,8	15,2*	24,0	6,8	17,4	23,3	29,4	19,7
Ansiolíticos	5,8	7,0*	12,4	0,7	5,0	8,8	10,7	10,5
Anticolinérgicos	2,6	1,3*	7,0	0,3	1,2	3,0	4,3	3,0
Barbitúricos	1,1	0,8	3,5	0,0	1,0	1,3	2,1	1,5
Opiáceos	0,0	0,4	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,3
Xaropes	0,1	0,5	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0
Alucinógenos	0,7	0,5	0,6	0,0	0,8	0,8	1,2	0,3
Orexígenos	0,3	1,4	2,1	0,2	1,0	1,3	1,6	0,7
Energéticos	17,8	7,2*	14,0	1,9	9,3	18,8	22,7	10,3
Esteróides/Anabolizantes	1,9	0,2*	2,9	0,1	0,2	1,5	2,0	2,4
Total tipos de uso•	27,4	22,2	31,4	8,4	22,5	30,6	36,5	28,9
Tabaco	27,1	26,9	25,3	4,1	25,2	39,8	34,7	33,9
Álcool	64,0	65,2	62,6	33,8	67,7	80,8	84,0	65,9

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).



### 1. População

• População geral	2.443.107 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>
• População de 10-19 anos	505.684 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>

### 2. Estudantes

Estudantes matriculados em 2004*			
Ensino	Escola Pública	Escola Privada	Total
Fundamental**	156.741	30.489	187.230
Médio	138.026	22.688	160.714
<b>Total</b>	<b>294.767</b>	<b>53.177</b>	<b>347.944</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

### 3. Amostra

	Escolas Públicas*	Escolas Sorteadas	Turmas Sorteadas
Municipais	25	0	0
Estaduais	214	20	84
Federais	02	0	0
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>20</b>	<b>84</b>

\*INEP-ME, 2003.

Questionários	Aplicados	1.807
	Em branco	234
	Excluídos	03
	<b>Válidos</b>	<b>1.570</b>

# Salvador-BA

## Equipe

supervisão

Antonio Nery Filho

coordenação

Patrícia Raquel de Aguiar Gonçalves

entrevistadores

Ana Iza Benigno dos Santos

Ana Rita Cordeiro de Andrade

Rita de Cássia Nascimento

Valéria Coutinho Cerqueira Lima

Wellington de Jesus Sousa

## SINOPSE

- I – A amostra foi constituída de 1.570 estudantes, sendo a maioria do sexo feminino (54,3%) e 66,1% pertencentes ao ensino fundamental. A maior parte da amostra correspondeu à faixa etária dos 10 aos 18 anos. A defasagem escolar atingiu 56,6% dos estudantes pesquisados. Somente 2,0% da amostra se encontra na classe social A (Tabela 1).
- II – Entre os alunos que já fizeram *uso na vida* de drogas (exceto tabaco e álcool), houve mais defasagem escolar de 3 anos ou mais (27,2%) que entre os sem esse uso (19,3%). Nota-se que os sem *uso na vida* (60,2%) não faltaram à escola contra 45,3% dos alunos com *uso na vida* que também não faltaram. Não houve predomínio de estudantes com *uso na vida* de drogas em nenhuma das classes sociais (Tabela 2).
- III – Os diferentes tipos de usos (*uso na vida, ano, mês, freqüente e pesado*) foram estatisticamente superiores entre estudantes do sexo masculino quando comparados ao feminino. Na faixa etária de 10 a 12 anos, 12,0% dos estudantes já fizeram *uso na vida* de drogas, exceto tabaco e álcool (Tabela 3).
- IV – Excetuando-se álcool e tabaco, as drogas mais freqüentemente utilizadas (*uso na vida*) pela ordem foram: solventes, ansiolíticos, maconha, anfetamínicos e cocaína. O uso de energéticos foi de 11,5%. O total estimado de *uso na vida*, entre estudantes das redes municipal e estadual de ensino em Salvador, foi de 17,7% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Na Tabela 5 observa-se que maconha, cocaína, opiáceos, tabaco e energéticos tiveram mais *uso na vida* pelo sexo masculino que pelo feminino. Essas diferenças são estatisticamente significantes. A partir dos 16 anos de idade aparecem as maiores porcentagens de *uso na vida*, para as diferentes drogas psicotrópicas, porém o *uso na vida* de solventes na faixa etária de 10 a 12 anos foi de 11,4%.

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 1.570 estudantes das redes municipal e estadual de Salvador.

Características		n	%
Sexo	Masculino	609	38,8
	Feminino	853	54,3
	Não informado	108	6,9
<b>Total</b>		<b>1570</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	369	23,5
	13-15	449	28,6
	16-18	415	26,4
	> 18	172	11,0
	Não informado	165	10,5
<b>Total</b>		<b>1570</b>	<b>100,0</b>
Grau escolar	Fundamental	1037	66,1
	Médio	533	33,9
	<b>Total</b>	<b>1570</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	517	32,9
	1 a 2	563	35,9
	≥ 3	325	20,7
	Não informado	165	10,5
<b>Total</b>		<b>1570</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico	A	32	2,0
	B	176	11,2
	C	653	41,6
	D	482	30,7
	E	137	8,7
	Não informado	90	5,7
<b>Total</b>		<b>1570</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.570 estudantes das redes municipal e estadual de Salvador, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>‡</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	446	34,5	71	25,7*
	1 a 2	468	36,2	95	34,4
	≥ 3	250	19,3	75	27,2*
	Não informado	130	10,0	35	12,7
<b>Total</b>		<b>1294</b>	<b>100,0</b>	<b>276</b>	<b>100,0</b>
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	779	60,2	125	45,3*
	1 a 3	283	21,9	73	26,4*
	4 a 8	55	4,3	18	6,5
	≥ 9	95	7,3	44	15,9*
	Não informado	82	6,3	16	5,8
<b>Total</b>		<b>1294</b>	<b>100,0</b>	<b>276</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	25	1,9	7	2,5
	B	138	10,7	38	13,8
	C	530	41,0	123	44,6
	D	404	31,2	78	28,3
	E	120	9,3	17	6,2
	Não informado	77	6,0	13	4,7
<b>Total</b>		<b>1294</b>	<b>100,0</b>	<b>276</b>	<b>100,0</b>

<sup>‡</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.570 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Salvador; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	18,9	16,5*	20,1	12,0	16,5	19,5	25,6	21,0
<i>Uso no ano</i>	16,1	14,3*	14,4	9,2	13,4	17,4	22,2	16,8
<i>Uso no mês</i>	12,6	10,3*	10,3	7,0	9,4	11,2	20,1	14,5
<i>Uso freqüente</i>	2,8	1,4*	0,7	0,6	1,6	1,8	3,8	2,8
<i>Uso pesado</i>	1,8	1,1*	0,0	0,4	0,8	1,4	1,3	1,4

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

\* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 1.570 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Salvador; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Freqüente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	3,4	2,8	2,0	0,4	0,3
Cocaína	1,6	1,3	0,9	0,1	0,0
Crack	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Anfetamínicos	2,5	2,3	1,4	0,5	0,3
Solventes	11,9	10,3	7,7	0,5	0,4
Ansiolíticos	3,5	3,1	1,9	0,4	0,3
Anticolinérgicos	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0
Barbitúricos	0,6	0,5	0,2	0,1	0,1
Opiáceos	0,5	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,3	–	–	–	–
Alucinógenos	0,3	–	–	–	–
Orexígenos	0,9	–	–	–	–
Energéticos	11,5	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	1,2	–	–	–	–
Total tipos de uso•	17,7	15,0	11,2	1,9	1,3
Tabaco	17,7	9,4	5,6	2,0	1,0
Álcool	63,1	62,1	46,9	13,8	8,8

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.570 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Salvador; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	6,1	1,5*	4,0	0,0	1,1	3,7	14,6	6,1
Cocaína	2,5	0,7*	2,5	0,0	0,2	1,3	4,5	3,4
Crack	0,7	0,2	0,8	0,2	0,2	0,0	1,4	1,0
Anfetamínicos	2,6	2,6	1,7	0,5	1,7	3,7	3,8	3,3
Solventes	12,7	11,0	13,6	11,4	12,6	11,1	8,5	12,5
Ansiolíticos	3,8	3,5	0,8	0,9	2,3	4,9	5,9	3,4
Anticolinérgicos	1,0	0,2	0,0	0,4	0,6	0,8	1,4	0,0
Barbitúricos	0,8	0,5	0,0	0,0	1,0	0,2	0,7	1,0
Opiáceos	1,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,7	1,0	1,0
Xaropes	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	0,0
Alucinógenos	0,5	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,0
Orexígenos	1,0	0,8	1,6	0,0	0,6	0,9	3,4	1,0
Energéticos	16,9	8,3*	7,2	3,6	9,3	16,5	18,6	8,5
Esteróides/Anabolizantes	2,6	0,0	2,4	0,0	0,4	1,4	4,9	1,5
Total tipos de uso•	18,9	16,5	20,1	12,0	16,5	19,5	23,8	21,0
Tabaco	20,2	16,0*	17,7	4,2	11,7	27,0	25,7	24,2
Álcool	63,4	64,2	51,2	29,3	60,7	77,8	77,9	65,1

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).





### 1. População

• População geral	870.028 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>
• População de 10-19 anos	208.309 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>

### 2. Estudantes

Estudantes matriculados em 2004*			
Ensino	Escola Pública	Escola Privada	Total
Fundamental**	75.014	15.872	90.886
Médio	65.014	10.314	75.699
<b>Total</b>	<b>140.399</b>	<b>26.186</b>	<b>166.585</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

### 3. Amostra

	Escolas Públicas*	Escolas Sorteadas	Turmas Sorteadas
Municipais	56	02	09
Estaduais	120	14	52
Federais	03	0	0
<b>Total</b>	<b>179</b>	<b>16</b>	<b>61</b>

\*INEP-ME, 2003.

Questionários	Aplicados	1.918
	Em branco	11
	Excluídos	03
	<b>Válidos</b>	<b>1.904</b>

# São Luís–MA

## Equipe

supervisão

Paulo Roberto Aranha de Macedo

coordenação

Eliana Rodrigues

entrevistadores

Maria Alua dos Santos Trindade

Sonia de Castro Ahid

## SINOPSE

- I – A amostra constou de 1.904 estudantes, sendo a maior porcentagem do sexo feminino (51,8%). Parte predominante da amostra concentra-se na faixa etária de 13 a 15 anos (39,1%), e 57,9% dos estudantes encontravam-se no ensino fundamental. Em São Luís, 39,6% dos estudantes apresentaram defasagem escolar, e somente 12,0% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Houve maior porcentagem de estudantes com *uso na vida* de drogas (exceto tabaco e álcool) com defasagem escolar quando comparados aos sem esse uso. Entre os sem *uso na vida* é menor o número de faltas à escola que entre os que já fizeram uso. Houve mais alunos com *uso na vida* pertencentes às classes sociais A ou B que os sem *uso na vida* para essas mesmas classes sociais (Tabela 2).
- III – Em todos os tipos de uso (*uso na vida, no ano, no mês, freqüente e pesado*) não houve predomínio estatisticamente significativo de um sexo sobre o outro. Nas faixas etárias de 16 a 18 anos e a partir de 18 anos de idade apareceram as maiores porcentagens de *uso na vida*, já entre 10 e 12 anos observou-se número significativo de usuários (10,8%) (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, maconha, anfetamínicos e ansiolíticos. O *uso na vida* de energéticos foi de 9,2%. A estimativa total de estudantes com *uso na vida*, nas redes municipal e estadual de ensino em Recife, foi de 22,9% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Houve predomínio de *uso na vida* para o sexo masculino sobre o feminino com diferenças estatisticamente significantes para maconha, tabaco e energéticos. O contrário acontece para anfetamínicos, ansiolíticos e barbitúricos, os quais foram mais usados pelas mulheres. Na faixa etária de 10 a 12 anos, o uso de anfetamínicos aparece com 4,2% do total de estudantes dessa faixa etária (Tabela 5).

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 1.904 estudantes das redes municipal e estadual de São Luís.

Características		n	%
Sexo	Masculino	812	42,6
	Feminino	987	51,8
	Não informado	105	5,5
<b>Total</b>		<b>1904</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	417	21,9
	13-15	744	39,1
	16-18	495	26,0
	> 18	44	2,3
	Não informado	204	10,7
<b>Total</b>		<b>1904</b>	<b>100,0</b>
Grau escolar	Fundamental	1103	57,9
	Médio	801	42,1
<b>Total</b>		<b>1904</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	946	49,7
	1 a 2	589	30,9
	≥ 3	165	8,7
	Não informado	204	10,7
<b>Total</b>		<b>1904</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico	A	28	1,5
	B	200	10,5
	C	696	36,6
	D	624	32,8
	E	273	14,3
Não informado	83	4,4	
<b>Total</b>		<b>1904</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.904 estudantes das redes municipal e estadual de São Luís, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>†</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	771	52,6	175	40,0*
	1 a 2	440	30,0	149	34,1
	≥ 3	109	7,4	56	12,8*
	Não informado	147	10,0	57	13,0
<b>Total</b>		<b>1467</b>	<b>100,0</b>	<b>437</b>	<b>100,0</b>
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	883	60,2	192	43,9*
	1 a 3	439	29,9	157	35,9*
	4 a 8	65	4,4	40	9,2*
	≥ 9	37	2,5	30	6,9*
Não informado	43	2,9	18	4,1	
<b>Total</b>		<b>1467</b>	<b>100,0</b>	<b>437</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	19	1,3	9	2,1
	B	141	9,6	59	13,5**
	C	522	35,6	174	39,8
	D	503	34,3	121	27,7
	E	217	14,8	56	12,8**
Não informado	65	4,4	18	4,1	
<b>Total</b>		<b>1467</b>	<b>100,0</b>	<b>437</b>	<b>100,0</b>

<sup>†</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

\*\* Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.904 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de São Luís; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	24,7	20,9	24,8	10,8	24,7	27,4	19,3	22,5
<i>Uso no ano</i>	20,3	18,0	21,4	8,3	20,9	24,1	15,9	19,2
<i>Uso no mês</i>	16,0	14,0	18,0	8,4	14,6	19,5	13,6	16,2
<i>Uso freqüente</i>	1,9	1,8	4,8	0,3	1,8	2,8	1,1	3,8
<i>Uso pesado</i>	1,4	0,8	2,9	0,1	1,2	1,0	1,1	1,9

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 1.904 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de São Luís; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Frequente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	4,4	3,1	2,4	0,5	0,3
Cocaína	0,8	0,9	0,7	0,1	0,1
Crack	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0
Anfetamínicos	2,6	2,4	1,5	0,4	0,3
Solventes	17,6	16,5	11,9	1,1	0,6
Ansiolíticos	2,2	2,0	1,6	0,2	0,1
Anticolinérgicos	2,0	0,5	0,5	0,1	0,0
Barbitúricos	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1
Opiáceos	0,3	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,4	–	–	–	–
Alucinógenos	0,1	–	–	–	–
Orexígenos	1,2	–	–	–	–
Energéticos	9,4	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	0,7	–	–	–	–
Total tipos de uso•	23,0	19,4	15,2	2,1	1,3
Tabaco	25,3	15,2	8,9	2,2	1,5
Álcool	65,4	63,1	43,2	11,0	5,9

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.904 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de São Luís; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	6,3	2,3	9,5	0,0	2,0	8,5	9,1	11,3
Cocaína	1,4	0,5	0,0	0,0	0,3	1,4	4,5	2,5
Crack	0,4	0,4	1,9	0,0	0,5	0,6	0,0	1,0
Anfetamínicos	3,0	2,4	1,9	0,7	3,9	2,4	2,3	2,5
Solventes	19,7	15,8	19,0	6,7	19,1	23,2	25,0	19,6
Ansiolíticos	1,4	2,7	3,8	1,2	2,0	2,2	9,1	3,4
Anticolinérgicos	2,7	1,6	0,0	3,4	2,7	0,6	0,0	0,5
Barbitúricos	0,1	0,4	1,0	0,5	0,1	0,2	0,0	1,0
Opiáceos	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	1,0
Xaropes	0,5	0,2	1,0	0,2	0,3	0,4	0,0	1,0
Alucinógenos	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Orexígenos	0,6	1,7	1,0	0,0	1,3	1,2	4,5	2,5
Energéticos	10,3	8,1	14,3	1,4	9,4	14,5	18,2	11,3
Esteróides/Anabolizantes	1,1	0,2	2,9	0,2	0,5	0,8	4,5	1,5
Total tipos de uso•	24,9	20,8	28,6	11,3	24,3	27,3	38,6	27,9
Tabaco	28,6	21,4	36,2	2,9	22,8	39,8	45,5	40,2
Álcool	64,5	65,6	70,5	32,1	67,5	82,4	93,2	78,4

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).



### 1. População

• População geral	715.360 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>
• População de 10-19 anos	167.622 habitantes <sup>(IBGE, 2004)</sup>

### 2. Estudantes

Estudantes matriculados em 2004*			
Ensino	Escola Pública	Escola Privada	Total
Fundamental**	47.727	13.975	61.702
Médio	53.117	12.613	65.730
<b>Total</b>	<b>100.844</b>	<b>26.588</b>	<b>127.432</b>

\*INEP-ME, 2004.

\*\*Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série.

### 3. Amostra

	Escolas Públicas*	Escolas Sorteadas	Turmas Sorteadas
Municipais	52	06	17
Estaduais	93	09	46
Federais	02	01	04
<b>Total</b>	<b>147</b>	<b>16</b>	<b>67</b>

\*INEP-ME, 2003.

Questionários	Aplicados	1.974
	Em branco	12
	Excluídos	12
	<b>Válidos</b>	<b>1.950</b>

# Teresina-PI

## Equipe

supervisão

Lúcia Cristina Santos Rosa

coordenação

Izabel Aragão de Sousa Santos

entrevistadora

Sandra Valéria Sousa Cruz

## SINOPSE

- I – A amostra constou de 1.950 estudantes, sendo a maior porcentagem do sexo feminino (52,3%). Parte predominante da amostra concentra-se na faixa etária de 13 a 15 anos (34,2%), sendo que 69,7% dos estudantes encontravam-se no ensino fundamental. Em Teresina, 53,6% dos estudantes apresentaram defasagem escolar, e somente 10,0% da amostra pertencia às classes sociais A ou B (Tabela 1).
- II – Houve maior porcentagem de estudantes que fizeram *uso na vida* de drogas (exceto tabaco e álcool) com defasagem escolar quando comparados aos sem esse uso. Entre os sem uso é menor o número de faltas à escola que entre os com *uso na vida*. Houve mais alunos com *uso na vida* pertencentes às classes sociais A ou B que sem uso para essas mesmas classes sociais (Tabela 2).
- III – Exceto no *uso no ano*, nos demais tipos de uso (*na vida, no mês, freqüente e pesado*) houve predomínio estatisticamente significativo do sexo masculino sobre o feminino. Nas faixas etárias de 16 a 18 anos e a partir de 18 anos apareceram as maiores porcentagens de *uso na vida* de drogas, já entre 10 e 12 anos observou-se número significativo de estudantes que fizeram *uso na vida* de drogas (13,7%) (Tabela 3).
- IV – As drogas mais utilizadas pelos estudantes, excetuando-se álcool e tabaco, pela ordem foram: solventes, ansiolíticos, maconha, anfetamínicos e cocaína. O *uso na vida* de energéticos foi de 6,5%. A estimativa total de estudantes com *uso na vida*, nas redes municipal e estadual de ensino em Recife, foi de 24,5% – dados expandidos (Tabela 4).
- V – Houve predomínio de *uso na vida* para o sexo masculino sobre o feminino com diferenças estatisticamente significantes para maconha, solventes, anticolinérgicos e energéticos. O contrário acontece para os ansiolíticos e o álcool, os quais foram mais usados pelas mulheres. Na faixa etária de 10 a 12 anos, o uso de solventes aparece com 8,8% do total de estudantes dessa faixa etária (Tabela 5).

**Tabela 1:** Características sociodemográficas de 1.950 estudantes das redes municipal e estadual de Teresina.

Características		n	%
Sexo	Masculino	816	41,8
	Feminino	1019	52,3
	Não informado	115	5,9
<b>Total</b>		<b>1950</b>	<b>100,0</b>
Faixa etária (anos)	10-12	478	24,5
	13-15	666	34,2
	16-18	435	22,3
	> 18	186	9,5
	Não informado	185	9,5
<b>Total</b>		<b>1950</b>	<b>100,0</b>
Grau escolar	Fundamental	1359	69,7
	Médio	591	30,3
<b>Total</b>		<b>1950</b>	<b>100,0</b>
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	720	36,9
	1 a 2	704	36,1
	≥ 3	341	17,5
	Não informado	185	9,5
<b>Total</b>		<b>1950</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico	A	18	0,9
	B	177	9,1
	C	690	35,4
	D	743	38,1
	E	242	12,4
Não informado		80	4,1
<b>Total</b>		<b>1950</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 2:** O uso na vida de drogas psicotrópicas, segundo características sociais de 1.950 estudantes das redes municipal e estadual de Teresina, dados não expandidos.

Características		Uso na vida <sup>†</sup>			
		Não		Sim	
		n	%	n	%
Defasagem série/idade (anos)	Não tem	583	39,7	137	28,4*
	1 a 2	517	35,2	187	38,8
	≥ 3	223	15,2	118	24,5*
	Não informado	145	9,9	40	8,3
<b>Total</b>		<b>1468</b>	<b>100,0</b>	<b>482</b>	<b>100,0</b>
Dias em que faltou à escola nos últimos 30 dias	Vim todos os dias	958	65,3	251	52,1*
	1 a 3	349	23,8	161	33,4*
	4 a 8	55	3,7	29	6,0*
	≥ 9	48	3,3	29	6,0*
Não informado		58	4,0	12	2,5
<b>Total</b>		<b>1468</b>	<b>100,0</b>	<b>482</b>	<b>100,0</b>
Nível socio-econômico <sup>°</sup>	A	14	1,0	4	0,8
	B	116	7,9	61	12,7**
	C	519	35,4	171	35,5
	D	570	38,8	173	35,9
	E	187	12,7	55	11,4**
Não informado		62	4,2	18	3,7
<b>Total</b>		<b>1468</b>	<b>100,0</b>	<b>482</b>	<b>100,0</b>

<sup>†</sup> Para definição de *uso na vida*, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significativa entre *uso na vida*: não e sim. (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

<sup>°</sup> As chaves neste item indicam os agrupamentos feitos para a análise estatística.

\*\* Diferença estatisticamente significativa entre não-usuários e usuários das classes A e B, das classes C, D e E (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 3:** Uso de drogas psicotrópicas em geral (exceto tabaco e álcool) entre 1.950 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Teresina; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta os tipos de usos, conforme sexo e idade.

Tipos de usos <sup>◇</sup>	Sexo% <sup>‡</sup>			Idade (anos)% <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
<i>Uso na vida</i>	26,7	22,7*	22,1	13,7	26,1	36,2	17,9	21,8
<i>Uso no ano</i>	22,1	19,0	19,0	5,9	21,0	34,9	17,1	18,8
<i>Uso no mês</i>	16,7	15,1*	15,7	4,7	15,6	29,5	13,7	15,5
<i>Uso freqüente</i>	4,3	2,4*	1,7	0,5	3,7	5,8	3,4	2,3
<i>Uso pesado</i>	2,7	1,1*	0,0	0,4	1,9	2,6	2,1	0,3

<sup>◇</sup> Para definição de tipos de usos, vide Metodologia.

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia); a diferença para 100% em cada tipo de uso representa não-usuários para o mesmo tipo de uso.

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

\* Diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).

**Tabela 4:** Uso de drogas psicotrópicas por 1.950 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Teresina; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta as categorias e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Tipos de uso % <sup>‡</sup>				
	<i>Na vida</i>	<i>No ano</i>	<i>No mês</i>	<i>Freqüente</i>	<i>Uso pesado</i>
Maconha	4,0	2,8	2,2	0,4	0,3
Cocaína	1,4	0,6	0,6	0,0	0,0
Crack	0,7	0,5	0,6	0,0	0,0
Anfetamínicos	3,3	2,6	1,8	0,3	0,2
Solventes	19,2	17,1	12,0	2,2	1,1
Ansiolíticos	4,3	4,0	3,1	0,5	0,2
Anticolinérgicos	2,1	0,5	0,4	0,0	0,0
Barbitúricos	0,8	0,8	0,6	0,1	0,1
Opiáceos	0,2	– <sup>†</sup>	–	–	–
Xaropes	0,2	–	–	–	–
Alucinógenos	0,3	–	–	–	–
Orexígenos	0,7	–	–	–	–
Energéticos	6,5	–	–	–	–
Esteróides/Anabolizantes	0,3	–	–	–	–
Total tipos de uso•	24,5	20,4	16,0	3,2	1,7
Tabaco	22,2	13,8	8,6	3,0	1,7
Álcool	65,7	64,3	44,6	13,5	6,4

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>†</sup> O traço (–) indica dados não colhidos.

• Tipos de uso exclui tabaco e álcool. Vide definição de tipos de uso em Metodologia.

**Tabela 5:** *Uso na vida* de drogas psicotrópicas por 1.950 estudantes do ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual de Teresina; dados expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as diferentes drogas individualmente.

Drogas	Sexo % <sup>‡</sup>			Idade (anos) % <sup>‡</sup>				
	M	F	NI <sup>□</sup>	10-12	13-15	16-18	> 18	NI <sup>□</sup>
Maconha	5,5	2,7*	3,8	0,5	2,2	8,7	4,3	6,6
Cocaína	1,8	1,0	1,0	2,5	0,8	1,0	0,6	0,7
Crack	0,9	0,6	0,4	0,1	0,6	0,5	0,9	1,0
Anfetamínicos	3,0	3,4	3,0	1,0	3,2	4,2	1,6	5,6
Solventes	22,4	16,6*	18,5	8,8	20,4	31,6	14,9	13,2
Ansiolíticos	3,7	5,3*	0,0	2,1	4,4	7,0	4,1	1,4
Anticolinérgicos	2,5	1,8*	0,4	3,2	3,4	1,3	0,9	0,6
Barbitúricos	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	1,6	0,3	0,0
Opiáceos	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Xaropes	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Alucinógenos	0,3	0,4	0,0	0,1	0,1	0,8	0,0	0,0
Orexígenos	0,1	1,2	1,0	0,2	0,2	0,6	1,7	0,3
Energéticos	8,8	4,7*	5,1	0,8	6,8	11,6	7,2	3,7
Esteróides/Anabolizantes	0,7	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,7	0,0
Total tipos de uso•	26,7	22,7	22,1	13,7	26,1	36,2	17,9	21,8
Tabaco	22,8	20,9	29,7	3,9	19,6	40,0	19,8	29,2
Álcool	63,4	68,0*	61,1	33,3	67,4	81,9	73,6	70,4

<sup>‡</sup> As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).

<sup>□</sup> NI significa dados não informados pelos alunos.

• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.

\* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do  $\chi^2$ ,  $p < 0,05$ ).